Les deses sont :

l'ordense orientale du pêcher

et le 31 mat, là où le derpier est antérieur au 11 mai.



Les conditions climatiques restent très favorables au développeme

# LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Les doses de **produits cupriques** devrant être réduites au minimum nécessai temps frais se prolonge pendan**Z À LA CAMO AL A**nents.

Les bouillies suifocalciques et sources micronisés mouillables

22, rue de Brest — LYON Téléphone : Franklin 82-51

Poiriers

750 gr 003 Bimensuel

Compte chèques postaux Lyon 2168-43

Fédération des Groupements de Défense, 7, place Ampère - L Y O N

sans précautions particulières aux doses indiquées par les fabricants

el entre empilique BETTERAVES - Note nº II - Tous départements sainte de nel

#### Teigne:

Malgré le temps défavorable, les adultes de la teigne de la betterave ont fait leur apparition dans le sud de la région. H'm odoN - ERMONY

L'éclosion des premières larves est attendue aux environs du 25 mai au plus tôt; ces éclosions ne pouvant prendre une certaine ampleur qu'avec le retour de la chaleur.

En conséquence, un poudrage ou une pulvérisation au H.C.H., ou D.D.T., ou S.P.C., ou T.T.C., ou chlordane, ou un poudrage au S.N.P., est recommandé avant le 27 mai (inclusivement) dans les régions suivantes :

ARDECHE: Toutes vallées et plaines au-dessous de 350 m d'altitude;

DROME: Plaines et vallées au-dessous de 400 m. d'altitude;

ISERE : Toutes plaines et vallées au-dessous de 300 m. d'altitude et situées au sud de la ligne: LES ROCHES-DE-CONDRIEU, VOIRON, TENCIN.

Dans les autres régions de ces départements et dans les autres départements, ce traitement sera effectué entre le 30 mai et le 4 juin inclusivement. par des inches angulousels, décolordes,

Note importante : Au cas où le démariage n'aurait pas encore été effectué à la date indiquée, ne l'appliquer qu'immédiatement après cette opération.

### Cassides:

Les cassides ont également fait leur apparition dans le sud de la région,

Les larves de cet insecte sont verdâtres et facilement reconnaissables à leurs contours anguleux, « en étoile »; elles dévorent rapidement le feuillage de la même façon que les Altises.

Un traitement spécial n'est pas actuellement nécessaire, celui dirigé contre la teigne couvrant également les risques de dégâts par les cassides.

Les produits conseillés plus haut sont tous efficaces contre les cassides.



leur apparition.

#### ARBRES FRUITIERS - Note no IX

#### Tavelure:

Les conditions climatiques restent très favorables au développement de cette maladie. Des taches primaires sont déjà signalées. D'autre part, des pluies plus ou moins abondantes se sont produites depuis le 15 mai, et la croissance des fruits a été assez rapide.

En conséquence, un troisième traitement sera appliqué entre le 26 et le 29 mai, partout où le dernier est antérieur au 13 mai.

Les doses de produits cupriques devront être réduites au minimum nécessaire, surtout si le temps frais se prolonge pendant la période des traitements.

Les doses sont:

| / Leuanemid . leuanemid .  | Poiriers      | RPommiers  |
|--|---------------|--|
| Sulfate de la bouillie bordelaise                                  | 1fkg.ais ang. | xasi750 gr.pans alqmcQ                               |
| Oxychlorure à 16 %   | 1 kg. 500     |  |
| — à 32 %   | 750 gr.       | 600 gr.  |
| — à 50 %   | 500 gr.       | 400 gr.  |
| 호텔은 경기에는 전 구입자 연구를 통고했다고 있다. 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 |               | 1. 点型配料 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. |

Les bouillies sulfocalciques et soufres micronisés mouillables pourront être appliqués sans précautions particulières aux doses indiquées par les fabricants.

# Tordeuse orientale du pêcher :

En pépinières seulement, un second traitement contre la tordeuse sera appliqué entre le 26 et le 31 mai, là où le dernier est antérieur au 11 mai.

#### VIGNES - Note nº II

Malgré le temps détavorable, les adultes de la freigne de la petterave ent lait leur appa-

# L'éclosion des premières latives est attandance aux environs de 25 mai au , chis : woibliM

Des taches primaires sont déjà signalées dans le sud de la circonscription.

Un second traitement au cuivre devra être apliqué entre le 25 et le 28 mai inclus, sur les vignes où le dernier traitement est antérieur au 15 mai dans les régions suivantes :

DROME: Régions: 122, 124, 125, 131, 132, 133, 134.

ARDECHE: Régions: 142, 143, 147 (au-dessous de 120 m. d'altitude), 152.

## Lie de 1998 : Touces plaines et valiées au-descode de 200 m. d'altitude et aituées au sumuibro

Les premières attaques de l'Oïdium de la vigne sont assez difficiles à déceler : elles ne s'accompagnent pas obligatoirement d'un duvet apparent, comme il est de règle par la suite : elles se traduisent par des taches anguleuses, décolorées, transparentes, groupées en général près des nervures.

De telles taches ont été constatées dans diverses stations de la DROME et de l'ARDECHE.

Sur toutes les vignes où de telles taches se manifesteraient, appliquer un traitement au soufre dès leur apparition.

— Dans les régions indiquées ci-dessus au chapitre « Mildiou », les deux traitements pourront être combinés. . Les larves de cet insecte sont verdâtres et lautement reconnelssables à leurs contours

sould est our Le Contrôleur ob agallical al gramabigar transcolo L'Inspecteur at xualugue

rition dans le aud de la région.

-un chargé des Avertissements agricoles : de la Protection des Végétaux :

P. LATARD. squisses sel req stages ob seur P. Dumas according to the very

Les produits conseillés plus hant sont tous efficaces contre les cassides 

22, rue de Brest